

MAT104 Problem Saati

Araş. Gör. İsmail GÜZEL

iguzel@itu.edu.tr

<https://web.itu.edu.tr/iguzel/>

İstanbul Teknik Üniversitesi

Soru 1.

$F(x, y, z) = \ln(x + 2y + 2z)$ fonksiyonunun $P_0(1, -1, 1)$ noktasında $\vec{A} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ yönündeki doğrultu türevini bulunuz.

F fonksiyonunun P_0 noktasındaki v birim vektörü yönündeki doğrultu vektörü $(D_{\vec{v}} F)_{P_0} = (\nabla F)_{P_0} \cdot \vec{v}$, $\nabla F = \frac{\partial F}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial F}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial F}{\partial z} \vec{k}$

$$\left. \frac{\partial F}{\partial x} \right|_{(1, -1, 1)} = \frac{1}{x + 2y + 2z} \Big|_{(1, -1, 1)} = 1$$

$$\left. \frac{\partial F}{\partial y} \right|_{(1, -1, 1)} = \frac{2}{x + 2y + 2z} \Big|_{(1, -1, 1)} = 2$$

$$\left. \frac{\partial F}{\partial z} \right|_{(1, -1, 1)} = \frac{2}{x + 2y + 2z} \Big|_{(1, -1, 1)} = 2$$

$$\vec{v} = \frac{\vec{A}}{\|\vec{A}\|} = \frac{1}{\sqrt{3}} (\vec{i} - \vec{j} + \vec{k})$$

Sonuç olarak,

$$\begin{aligned} (D_{\vec{v}} F)_{P_0} &= (\nabla F)_{P_0} \cdot \vec{v} \\ &= (\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}) \cdot (\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} (1 - 2 + 2) = \frac{1}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

Soru 2.

Hangi doğrultuda $f(x, y) = xy + x^2$ fonksiyonunun $P_0(2, 3)$ deki doğrultu türevi 0 dir ?

Varsayalım ki $f(x, y)$ 'nin $P_0(2, 3)$ noktasında $\vec{v} = v_1 \vec{i} + v_2 \vec{j}$ yönündeki doğrultu türevi sıfır olsun. $\|\vec{v}\| = 1$ olması için $v_1^2 + v_2^2 = 1$ olmalıdır.

$$(D_{\vec{v}} f)_{P_0} = (\nabla f)_{P_0} \cdot \vec{v} = (7\vec{i} + 2\vec{j}) \cdot (v_1 \vec{i} + v_2 \vec{j}) = 0$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(2,3)} = y + 2x \Big|_{(2,3)} = 7 \Rightarrow 7v_1 + 2v_2 = 0 \Rightarrow v_1 = -\frac{2}{7}v_2$$

$$v_1^2 + v_2^2 = 1 \Rightarrow \left(-\frac{2}{7}v_2\right)^2 + v_2^2 = 1$$

$$\Rightarrow \frac{53v_2^2}{49} = 1 \Rightarrow v_2^2 = \frac{49}{53}$$

$$v_2 = \pm \frac{7}{\sqrt{53}}$$

Sonuç olarak,

$$v_1 = \pm \frac{2}{\sqrt{53}} \quad \text{ve} \quad v_2 = \mp \frac{7}{\sqrt{53}} \Rightarrow$$

$$\vec{v} = \frac{2}{\sqrt{53}} \vec{i} - \frac{7}{\sqrt{53}} \vec{j}$$

$$\text{yada } \vec{v} = -\frac{2}{\sqrt{53}} \vec{i} + \frac{7}{\sqrt{53}} \vec{j}$$

Soru 3.

$A(3, -2, 1), B(3, 2, 3)$ veriliyor. $F(x, y, z) = e^{xz} \cos y + \ln(xz) + \sin(yz)$ fonksiyonunun $(2, 0, 1/2)$ noktasında \vec{AB} doğrultusu yönündeki türevini bulunuz.

$$\vec{AB} = B - A = (3, 2, 3) - (3, -2, 1) = (0, 4, 2)$$

$$\vec{v} = \frac{\vec{AB}}{\|\vec{AB}\|} = \frac{1}{\sqrt{4^2 + 2^2}} \cdot (0, 4, 2) = \frac{1}{2\sqrt{5}} (0\vec{i} + 4\vec{j} + 2\vec{k}) = \frac{2}{\sqrt{5}}\vec{j} + \frac{1}{\sqrt{5}}\vec{k}$$

$$\left. \frac{\partial F}{\partial x} \right|_{(2, 0, 1/2)} = \left(ze^{xz} \cos y + \frac{z}{xz} \right) \Big|_{(2, 0, 1/2)} = \frac{e}{2} + \frac{1}{2} = \frac{e+1}{2}$$

$$\left. \frac{\partial F}{\partial y} \right|_{(2, 0, 1/2)} = \left(e^{xz} (-\sin y) + \cos(yz) \cdot z \right) \Big|_{(2, 0, 1/2)} = \frac{1}{2}$$

$$\left. \frac{\partial F}{\partial z} \right|_{(2, 0, 1/2)} = \left(xe^{xz} \cos y + \frac{x}{xz} + \cos(yz) \cdot y \right) \Big|_{(2, 0, 1/2)} = 2e + 2 = 2(e+1)$$

$$\begin{aligned} (D_{\vec{v}} F)_{P_0} &= (\nabla F)_{P_0} \cdot \vec{v} \\ &= \left(\frac{e+1}{2} \cdot \vec{i} + \frac{1}{2} \vec{j} + 2(e+1) \vec{k} \right) \cdot \left(0 \vec{i} + \frac{2}{\sqrt{5}} \vec{j} + \frac{1}{\sqrt{5}} \vec{k} \right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} + \frac{2(e+1)}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{2e+3}{\sqrt{5}} \quad // \end{aligned}$$

Soru 4.

$f(x, y) = 2x^2 + y^3$ veriliyor. $f(x, y)$ fonksiyonunun $Q(-1, 1)$ noktasındaki en hızlı artışı hangi doğrultuda olur? Bu doğrultudaki değişim hızı nedir?

$f(x, y)$ 'nin $Q(-1, 1)$ noktasında \vec{v} yönündeki doğrultu türevi $(D_{\vec{v}}f)_Q = (\nabla f)_Q \cdot \vec{v}$

$$\begin{aligned} (\nabla f) \Big|_{(-1, 1)} &= \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(-1, 1)} \cdot \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(-1, 1)} \cdot \vec{j} \\ &= (4x) \Big|_{(-1, 1)} \cdot \vec{i} + (3y^2) \Big|_{(-1, 1)} \cdot \vec{j} = -4\vec{i} + 3\vec{j} \end{aligned}$$

Fonksiyon en hızlı olarak ∇f yönünde artar, $-\nabla f$ yönünde azalır.

$$(\nabla f)_Q \cdot \vec{v} = |(\nabla f)_Q| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \theta \quad \theta = 0 \Rightarrow \cos \theta = 1 \quad (\text{aynı yön})$$

$$\vec{v} = \frac{(\nabla f)_Q}{|(\nabla f)_Q|} = \frac{1}{\sqrt{(-4)^2 + 3^2}} \cdot (-4\vec{i} + 3\vec{j}) = -\frac{4}{5}\vec{i} + \frac{3}{5}\vec{j}$$

$$(D_{\vec{v}}f)_Q = |(\nabla f)_Q| = \sqrt{(-4)^2 + 3^2} = 5$$

Soru 5.

$yz = 1 - x^3$ yüzeyinin $(-1, 2, 1)$ noktasındaki teğet düzlem ve bu yüzeye normal olan doğrunun denklemini bulunuz.

$$f(x, y, z) = c \quad P_0(x_0, y_0, z_0) \text{ 'da teğet düzlem: } f'_x(P_0)(x-x_0) + f'_y(P_0)(y-y_0) + f'_z(P_0)(z-z_0) = 0$$

$$\text{Normal doğru: } (x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + \nabla f(P_0) \cdot t, \quad t \in \mathbb{R}$$

$$x = x_0 + f'_x(P_0) \cdot t, \quad y = y_0 + f'_y(P_0) \cdot t, \quad z = z_0 + f'_z(P_0) \cdot t$$

$$f(x, y, z) = yz + x^3 - 1, \quad P_0(-1, 2, 1),$$

$$(\nabla f)_{P_0} = \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{P_0} \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{P_0} \vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \Big|_{P_0} \vec{k} = 3x^2 \Big|_{(-1, 2, 1)} \vec{i} + z \Big|_{(-1, 2, 1)} \vec{j} + y \Big|_{(-1, 2, 1)} \vec{k}$$

$$\text{Teğet Düzlemi: } (3)(x+1) + (1)(y-2) + (2)(z-1) = 0$$

$$\Rightarrow 3x + 3 + y - 2 + 2z - 2 = 0 \Rightarrow 3x + y + 2z = 1 //$$

$$\text{Normal Doğru: } x = -1 + 3t, \quad y = 2 + t, \quad z = 1 + 2t, \quad t \in \mathbb{R} //$$

Soru 6.

f fonksiyonu, $f(0) = 2$ olacak şekilde diferansiyellenebilen bir fonksiyondur. $z = xyf\left(\frac{y}{x}\right)$ yüzeyine $P(1,0,0)$ noktasında teğet olan düzlem denklemini bulunuz.

$$g(x,y,z) = xyf\left(\frac{y}{x}\right) - z \text{ olsun.}$$

$g(x,y,z) = 0$ yüzeyine $P(1,0,0)$ noktasında teğet olan düzlem denklemini

$$g_x|_P (x-1) + g_y|_P (y-0) + g_z|_P (z-0) = 0$$

$$g_x|_P = \left. y f\left(\frac{y}{x}\right) + xy \cdot f'\left(\frac{y}{x}\right) \left(-\frac{1}{x^2}\right) \right|_{(1,0,0)} = 0$$

$$g_y|_P = \left. x f\left(\frac{y}{x}\right) + xy \cdot f'\left(\frac{y}{x}\right) \cdot \left(\frac{1}{x}\right) \right|_{(1,0,0)} = 1 \cdot f(0) = 2$$

$$g_z|_P = -1|_{(1,0,0)} = -1$$

Teğet düzlem denklemini

$$0(x-1) + 2(y-0) + (-1)(z-0) = 0$$

$$2y - z = 0$$

Soru 7.

$z = \sqrt{25 - 9y^2}$ ve $z = 3y + e^{xy}$ yüzeylerinin $(0, 1, 4)$ noktasındaki kesişim eğrisine teğet olan doğrunun denklemini parametrik olarak bulunuz.

$$f(x, y, z) = \sqrt{25 - 9y^2} - z \quad \text{ve} \quad g(x, y, z) = 3y + e^{xy} - z$$

$\nabla f(0, 1, 4)$ vektörü, $f(x, y, z) = 0$ seviye yüzeyine $(0, 1, 4)$ noktasında diktir.


$\nabla g(0, 1, 4)$ vektörü, $g(x, y, z) = 0$ seviye yüzeyine $(0, 1, 4)$ noktasında diktir.

$$\nabla f(0, 1, 4) = f_x(0, 1, 4) \vec{i} + f_y(0, 1, 4) \vec{j} + f_z(0, 1, 4) \vec{k}$$

$$= 0 \cdot \vec{i} + \frac{1}{2\sqrt{25-9y^2}} \cdot (-18y^2) \Big|_{(0,1,4)} \vec{j} + (-1) \vec{k} = \boxed{0\vec{i} - \frac{9}{4}\vec{j} - \vec{k}}$$

$$\nabla g(0, 1, 4) = g_x(0, 1, 4) \vec{i} + g_y(0, 1, 4) \vec{j} + g_z(0, 1, 4) \vec{k}$$

$$= ye^{xy} \Big|_{(0,1,4)} \cdot \vec{i} + (3 + xe^{xy}) \Big|_{(0,1,4)} \cdot \vec{j} + (-1) \Big|_{(0,1,4)} \cdot \vec{k} = \boxed{\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}}$$



Yüzeylerin kesişim eğrisine teğet olan doğru $\nabla f(0,1,4) \times \nabla g(0,1,4)$ vektörü ile aynı yönlüdür.

$$\nabla f(0,1,4) \times \nabla g(0,1,4) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & -3/4 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3/4 & -1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 0 & -3/4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \vec{k}$$

$$= \frac{21}{4} \vec{i} - \vec{j} + \frac{9}{4} \vec{k}$$

$(0,1,4)$ noktasından geçen doğrunun doğrultu vektörü, $\frac{21}{4} \vec{i} - \vec{j} + \frac{9}{4} \vec{k}$ vektörü ile aynı yönlü old. için, doğru denklemi

$$x = 0 + (21/4)t$$

$$y = 1 + (-1)t$$

$$z = 4 + (9/4)t \quad , \quad t \in \mathbb{R} \quad \parallel$$

Soru 8.

$1 - x^3 - yz = 0$ yüzeyine $(-1, 2, 1)$ noktasında teğet olan düzlemi bulunuz ve teğet olan bu düzlemin $6x + 2y + 4z = 5$ düzlemine paralel olduğunu gösteriniz.

$$f(x, y, z) = 1 - x^3 - yz \text{ olsun.}$$

$f(x, y, z) = 0$ yüzeyine $(-1, 2, 1)$ noktasında teğet olan düzlem denklemini

$$f_x(-1, 2, 1)(x+1) + f_y(-1, 2, 1)(y-2) + f_z(-1, 2, 1)(z-1) = 0$$

$$f_x(-1, 2, 1) = -3x^2 \Big|_{(-1, 2, 1)} = -3$$

$$f_y(-1, 2, 1) = -z \Big|_{(-1, 2, 1)} = -1$$

$$f_z(-1, 2, 1) = -y \Big|_{(-1, 2, 1)} = -2$$

$$-3(x+1) + (-1)(y-2) + (-2)(z-1) = 0$$

$$-3x - 3 - y + 2 - 2z + 2 = 0$$

$$\Rightarrow 3x + y + 2z = 1 \Rightarrow \vec{n}_1 = (3, 1, 2)$$

$$6x + 2y + 4z = 5 \Rightarrow \vec{n}_2 = (6, 2, 4)$$

$\vec{n}_2 = 2 \cdot \vec{n}_1$ old. düzlemler paraleldir. //